

Fågel- och bobygge i naturen

De här korten kan användas för att bygga egna fåglar och bon av naturmaterial. Försök bygga fågelns bo på en sådan plats som fågeln på riktigt skulle välja för bobygget. Försök sen att avbilda själva fågeln med sådant som du hittar i naturen. Det gäller att fokusera på form, färg, näbbens form och till exempel huvudets position för att få fågeln att se naturtrogen ut.

Kom ihåg att följa allemansrätten; vi människor får inte plocka mossa fastän fåglar gör det. Det kan vara roligt att istället ta med lite ull eller hundhår att använda.

Rödhake

- **Flyttfågel**

Bygger sitt bo av löv, mossa, gräs, djurhår och växtrötter. Boet är för det mesta nära marken, vid roten av ett litet träd.

Lägger 2–8 ägg i april–maj. Endast honan ruvar i 12–15 dygn.

Ungarna stannar i boet i ca två veckor och lämnar det då de ännu inte kan flyga. Rödhaken kan få en andra kull med ungar under samma sommar.

Äter små ryggradslösa djur, frön och bär.

Tofsvipa

- **Flyttfågel**

Bygger bo i en låg grop på en åker, äng eller dikeskant.

Lägger 4 ägg i april–maj. Båda könen ruvar i 20–29 dygn. Ungarna springer tidigt iväg från boet och söker mat själva innan de kan flyga.

Äter ryggradslösa djur.

Kråka

- **Stannfågel, men en del flyttar**

Bygger bo högt uppe i ett träd av kvistar, lera, ull, fjädrar och tygbitar.

Lägger 2–6 ägg i april–maj. Honan ruvar i ca 3 veckor. Ungarna är kring en månad gamla då de hoppar ur boet.

Allätare. Äter t.ex. mask, fågelungar och avfall.

Blåmes

- **Stannfågel, men en del flyttar**

Bygger boet av mossa, ull, hår och dun i en håla i ett träd eller en holk.

Lägger 6–14 ägg i april–maj. Honan ruvar i 12–15 dygn. Ungarna hoppar ut ur boet när de är ca 3 veckor gamla och ännu ganska dåliga på att flyga.

Äter ryggradslösa djur och frön. Kommer gärna till en fågelmatning på vintern.



Skäggdopping

- **Flyttfågel**

Bygger ett flytande bo bland vattenväxter t.ex. inne i vassen.

Lägger 3–6 ägg i maj–juni. Båda könen ruvar i 25–29 dygn. Ungarna följer med föräldrarna den första sommaren och blir matade av dem. De kan rida på föräldrarnas rygg.

Äter fisk (främst mört och löja), insekter, kräftdjur, blötdjur och grodyngel.

Koltrast

Bygger oftast boet lågt nere i ett träd, i bland- eller lövskogar. Boet byggs av torrt gräs och lera och har mossa ytterst.

Lägger 2–6 ägg oftast i april–maj, men ibland också tidigare på våren eller mot hösten. Honan ruvar i 11–14 dygn. Ungarna är i boet i ca 2 veckor innan de hoppar ner på marken och lär sig flyga.

Äter ryggradslösa djur, bär och frön.

Skrattmås

• Flyttfågel

Bygger boet av vattenväxter flytande på vattnet eller på strand klippor. Lägger 1–3 ägg i slutet av april. Båda könen ruvar i 21–23 dygn. Det räcker ca 1 månad efter kläckningen tills ungarna kan flyga.
Allätare.

Större hackspett

• Stannfågel

Hackar varje år ett nytt hål i ett lövträd. Det tar ca en vecka att hacka en bohåla. Äggen läggs inne i bohålan på en bädd av spån som har lossnat från trädet då fågeln har hackat.
Lägger 5–7 ägg i maj. Båda könen ruvar i 10–12 dygn. Ungarna kan flyga när de är ca 3 veckor gamla.
Äter frön från kottar, insekter, fågelungar och ägg.

Ladusvala

• Flyttfågel

Bygger sitt bo på byggnader (t.ex. under en takkant) eller under broar och bryggor. Boet byggs av lera och halm.



Lägger 4–7 ägg i maj–juni. Troligen endast honan ruvar i 14–16 dygn. Ungarna är i boet ca 3 veckor efter kläckningen men föräldrarna tar hand om dem ännu flera veckor efter att de lämnat boet.
Äter flygande insekter.

Kattuggla

• Stannfågel



Bygger sitt bo i en håla i ett lövträd (t.ex. en ihålig, gammal ek), i en stor holk eller i en byggnad. De inreder oftast inte med naturmaterial i bohålan
Lägger 1–6 ägg i mars–april. Honan ruvar i ca en månad. Ungarna är i boet ca en månad efter att de har kläckts och det tar några dagar till innan de kan flyga.
Äter små däggdjur och fåglar.

Trana

• Flyttfågel



Flyttfågel. Flyttar i stora plogar och trumpetar ljudligt.
Bygger sitt bo på en mosse eller i vassen. Boet byggs av grenar, gröna växtdelar och torrt gräs.
Lägger 1–2 ägg i slutet av april. Båda könen ruvar i ca en månad. Ungarna lämnar boet genast efter kläckningen.
Äter frön, bär, ryggradslösa djur, grodor och kräldjur, samt ibland smågnagare och fågelungar.

Barnens fågelvecka

Planering: Emilia Nordling / Åbolands naturskola / Natur och Miljö
Illustrationer: Maija Karala / Lasten luontolehti Sieppo
Källa: www.luontoportti.com